


### 3.5 Consumo de tabaco según dominio de residencia

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, correspondiente al año 2019, las personas que residen en Lima Metropolitana y Selva presentaron las mayores prevalencias de consumo de cigarrillos con cifras de 13.1% y 11.9% respectivamente.

Al analizar y comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles” de los años 2014 y 2019, se pudo observar que el consumo de tabaco en Lima Metropolitana presentó prevalencias en el rango de 13% a 15%; mientras que, las cifras de la costa y sierra se encontraron en el rango de 7% a 11% en el mismo periodo de tiempo. En la Selva, la prevalencia de consumo actual de cigarrillos disminuyó 3.1 puntos porcentuales, con cifras de 15.0% (IC 95%: 13.6; 16.3) en el año 2014 y 11.9% (IC 95%: 11.0; 12.9) en el año 2019.

#### Personas de 15 años a más que actualmente fuman cigarrillos según región natural. Perú, 2014-2019



(1) No incluye Lima Metropolitana

**Fuente:** Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familia, Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.