


3.8 Consumo de tabaco según quintil de bienestar.

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, correspondiente al año 2019, las personas del quintil superior y cuarto quintil, presentaron prevalencias que casi duplicaron lo observado en las personas del quintil inferior (**7.7%**), evidenciándose que **una de cada diez personas de 15 a más años de todos los quintiles de bienestar, fumaban cigarrillos al momento de la encuesta.**

Al analizar y comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, 2014 y 2019, se observó que el consumo de tabaco en las personas del cuarto quintil y quintil superior presentaron cifras en estables en el rango de 11% a 17%; mientras que las personas del quintil inferior y segundo quintil, presentaron cifras en el rango de 7% a 11%, en dicho periodo. En el quintil intermedio, la prevalencia disminuyó 2.2 puntos porcentuales, con cifras de 13.0% (IC 95%: 11.6; 14.4) en el año 2014 y 10.8% (IC 95%: 9.5; 12.1) en el año 2019.

Personas de 15 años a más que actualmente fuman cigarrillos según quintil de bienestar. Perú 2014-2019



e

: Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familia, Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.