


4.1 Tendencia del consumo de alcohol

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, durante el año 2019, el 92.6% de las personas de 15 y más años consumieron alguna vez alguna bebida alcohólica; evidenciándose que, **nueve de cada 10 personas consumió alguna vez alguna bebida alcohólica**, y la misma proporción se observa en ambos sexos.

Entre los años 2014 y 2019, la prevalencia de hombres que consumieron alcohol alguna vez se mantuvo en el rango de 94% y 96%; mientras que, en el caso de las mujeres, su prevalencia se incrementó 2.4 puntos porcentuales, con cifras de 86.7% (IC 95%: 85.9; 87.6) en el año 2014 y 89.8% (IC 95%: 89.2; 90.5) en el 2019.


Personas de 15 y más años que consumieron alguna vez alguna bebida alcohólica según sexo. Perú 2014-2019



Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familia, Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, durante el año 2019, el 69.3% de las personas de 15 y más años consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses; evidenciándose un incremento de 2,4 puntos porcentuales en comparación al año 2014, en donde la prevalencia fue 66.9% (IC 95%: 65.9; 67.8).

Personas de 15 y más años que consumieron alguna vez alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses. Perú 2014-2019




Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familia, Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Según el “Estudio nacional sobre prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2017”; el 17.5% de los estudiantes de secundaria⁸ del Perú, consumió alcohol alguna vez en los últimos 12 meses, en caso de los varones fue 15.5% y de las mujeres 19.5%.

Entre los años 2007 y 2017, la prevalencia del consumo de alcohol en los escolares de secundaria disminuyó 12.4 puntos porcentuales, pasando de 29.9% en el 2007 a 17.5% en el año 2017.

⁸ Estudiantes de 1º a 5º año de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas del área urbana ubicadas en ciudades de 30,000 y más habitantes de la costa, sierra y selva del país

Prevalencia anual del consumo de drogas legales como el alcohol en la población escolar de nivel secundaria . Perú, 2007 - 2017




Fuente: Elaboración propia a partir de: DEVIDA. Estudio nacional sobre prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2017. Lima, 2019.

Asimismo, según el III Estudio Epidemiológico Andino sobre consumo de drogas en la población universitaria del Perú, en el año 2016; el 37.7% de la población universitaria del Perú consumieron alcohol alguna vez en los últimos 30 días; evidenciándose que, **cuatro de cada diez personas consumieron alcohol en los últimos 30 días.**

Entre los años 2009 y 2016, la prevalencia del consumo de alcohol en varones universitarios disminuyó 7.4 puntos porcentuales, pasando de 52.4% en el 2009 a 45.0% en el año 2016; mientras que para el caso de las mujeres, la disminución fue de 11.3 puntos porcentuales, pasando de 41.3% en el 2009 a 30% en el año 2016.

Tendencia del consumo de alcohol en la población universitaria según sexo. Perú, 2009, 2012 y 2016



Fuente: UNODC, DEVIDA. III Estudio Epidemiológico Andino sobre consumo de drogas en la población universitaria del Perú, 2016. Lima, junio 2017