


4.8 Consumo de alcohol según quintil de bienestar.

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, correspondiente al año 2019, las personas del quintil superior presentaron prevalencias que duplicaron lo observado en las personas del quintil inferior. Encontramos entonces que **una de cada dos personas de 15 a más años del quintil superior, consumieron alcohol en los últimos 30 días; en las personas del quintil intermedio y cuarto quintil el consumo fue en dos de cada cinco; mientras que en las del segundo intermedio tres de cada diez personas y las del quintil inferior dos de cada diez personas consumieron alcohol en los últimos 30 días.**

Al analizar y comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, 2014 y 2019, se observó que el consumo de alcohol en las personas del quintil intermedio y quintil superior disminuyó 1.4 puntos porcentuales, con cifras en caso del quintil intermedio de 38.2% (IC 95%: 36.3; 40.0) en el año 2014 y 36.8% (IC 95%: 35.0; 38.6) en el año 2019; en relación al quintil superior de 47.8% (IC 95%: 45.5; 50.2) en el año 2014 y 46.4% (IC 95%: 44.1; 48.7) en el año 2019. En el cuarto quintil y quintil superior, la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días presentó cifras en el rango de 37% a 48%; mientras que las personas del quintil inferior y segundo quintil, presentaron prevalencias en el rango de 20% a 30% en el mismo periodo de tiempo.

Personas de 15 y más años que consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días, según quintil de bienestar. Perú, 2014-2019



Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familia, Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.