


4.8 Consumo de alcohol según quintil de bienestar.

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, correspondiente al año 2016, las personas del quintil superior, presentaron prevalencias que duplicaron lo observado en las personas del quintil inferior. Encontramos entonces que **una de cada dos personas de 15 a más años del quintil superior, consumieron alcohol en los últimos 30 días; en las personas del quintil intermedio y cuarto quintil, el consumo fue en dos de cada cinco.**

Al analizar y comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, 2014 y 2016, se observó que el consumo de alcohol en las personas del cuarto quintil y quintil superior, presentaron cifras en estables en el rango de 38% a 48%; las del quintil intermedio, en el rango de 35% s 39%; mientras que las personas del quintil inferior y segundo quintil, presentaron cifras en el rango de 20% a 30% en los últimos tres años evaluados.

Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días, según quintil de bienestar.

Perú, 2014-2016



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2014, 2015 y 2016. Elaborado por el INS/CENAN.