


4.2 Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de pulmón

Para el período 2000-2011 se observó que la tendencia de la tasa ajustada de mortalidad para el cáncer de pulmón fue levemente ascendente, pasando de 9.4 defunciones por 100 000 habitantes el año 2000 a 10.6 defunciones por 100 000 habitantes (Un incremento del 12.8% en once años).


Tasa ajustada de mortalidad por Cáncer del pulmón. Perú, 2000-2011



Fuente: Sistema de Hechos Vitales. Certificado de defunción- MINSA - Oficina General de Estadística e Informática- Elaborado Dirección General de epidemiología

En el año 2011, la tasa ajustada de mortalidad por cáncer de pulmón presentó las cifras más elevadas en el Callao (20.1 por 100 000), Tumbes (14.3 por 100 000), Lima (14.2 por 100 000), Loreto (12.9 por 100,000), Huancavelica (12.0 por 100 000), Ica (11.4 por 100 000) y Lambayeque (10.2 por 100 000). La tasa más baja se pudo observar en los departamentos de Moquegua (3.5 por 100 000) y Cajamarca (3.4 por 100 000).

Tasa ajustada de mortalidad por Cáncer de pulmón según departamentos. Perú 2011



Fuente: Sistema de Hechos Vitales. Certificado de defunción- MINSA - Oficina General de Estadística e Informática- Elaborado Dirección General de epidemiología