


3.5 Consumo de tabaco según dominio de residencia

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, correspondiente al año 2018, las personas que residen en Lima Metropolitana y Selva, presentaron las mayores prevalencias de consumo de cigarrillos con cifras de 14.1% y 13.3% respectivamente.

Al analizar y comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles” de los años 2014 y 2018, se pudo observar que el consumo de tabaco en Lima Metropolitana presentó prevalencias en el rango de 13% a 16%; mientras que, las cifras de la costa y sierra, se encontraron en el rango de 7% a 12% en el mismo periodo de tiempo. En la Selva, la prevalencia de consumo actual de cigarrillos disminuyó 1.7 puntos porcentuales, con cifras de 15.0% (IC 95% 13.6;16.3) en el año 2014 y 13.3% (IC 95% 12.3;14.3) en el año 2018.

Personas de 15 años a más que actualmente fuman según región natural. Perú, 2014-2018



(1) No incluye Lima Metropolitana

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Elaborado por el INS/CENAN.