

3.8 Consumo de tabaco según quintil de bienestar.

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, correspondiente al año 2018, las personas del quintil superior y cuarto quintil, presentaron prevalencias que casi duplicaron lo observado en las personas del quintil inferior (**8.0%**), evidenciándose que **una de cada diez personas de 15 a más años de todos los quintiles de bienestar, fumaban cigarrillos al momento de la encuesta.**

Al analizar y comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, 2014 y 2018, se observó que el consumo de tabaco en las personas del cuarto quintil y quintil superior presentaron cifras en estable en el rango de 11% a 17%; mientras que las personas del quintil inferior y segundo quintil, presentaron cifras en el rango de 8% a 11%, en dicho periodo. En el quintil intermedio, la prevalencia disminuyó 2.0 puntos porcentuales, con cifras de 13.0% (IC 95% 11.6;14.4) en el año 2014 y 11.0% (IC 95% 9.8;12.2) en el año 2018.

Personas de 15 años a más que actualmente fuman según quintil de bienestar. Perú 2014-2018



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Elaborado por el INS/CENAN.