


4.1 Tasa estandarizada de mortalidad por Cáncer de estómago

Según el “Análisis de las causas de mortalidad en el Perú, 1986-2015”, para el período 1986-2015 se observó que la tendencia de la tasa estandarizada de mortalidad para el cáncer de estómago fue descendente, pasando de 35.5 defunciones por 100 000 habitantes el año 1986 a 20.7 defunciones por 100 000 habitantes (Una reducción del 41.7% en veintinueve años).


Tasa estandarizada de mortalidad por Neoplasia maligna de estómago. Perú, 1986-2015



Fuente: Base de datos defunciones 1986-2015. Oficina General de Tecnologías de la Información. MINSA

En el año 2015, la tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de estómago presentó las cifras más elevadas en departamentos de la sierra como Huancavelica (58.4 por 100 000), Huánuco (45.6 por 100 000), Ayacucho (42.4 por 100 000) y Apurímac (41.7 por 100,000). La tasa más baja se pudo observar en el departamento de Tumbes (4.0 por 100 000).

Tasa estandarizada de mortalidad por Neoplasia maligna de estómago según departamentos. Perú 2015



Fuente: Base de datos defunciones 1986-2015. Oficina General de Tecnologías de la Información. MINSa.